



ROSA HUDSONIANA.

R. Germinibus globosis pedunculisque glabris; foliis simpliciter serratis; petiolis villosulis subaculeatis; laciniis calycinis integris corollam inapertam superantibus; caule inermi, floribus corymbosis. (N.)

(a. SALICIFOLIA ⁽¹⁾.)

R. foliis oblongis, acutis, impari majori. (N.)

R. Corymbosa (de la baie d'Hudson), Du Pont, choix des Roses, etc. p. 5. R. Carolina corymbosa, Ejusd. Catal. inedit, série 29, n° 238.

LE ROSIER D'HUDSON.

(Variété à feuilles de saule.)

DESCRIPTION.

Ce Rosier que M. Du Pont a communiqué, a été par lui-même confondu avec le Rosier de la Caroline, et par d'autres

(1) *Habitus.* FRUTEX 2-3. pedalis, erectus, inermis. FOLIOLA plerumque quina, rarius septena, elongata, supra viridia, subtus glaucescentia, simpliciter et nunquam iterum serrata. PETIOLI undique villosi, aculeis recurvis minimis 2-3. saepe, praediti. STIPULAE conduplicate, apice subdenticulate, margine pilosae. PEDUNCULI, corymbosi vel cymosi, glabri, in pedicellos 3-6. divisi. PEDICELLI subglabri duabus bracteis ad basim suffulti. BRACTEAE ovato lanceolatae margine ciliatae. TUBUS CALYCIS globosus, aliquando nonnullis scitis glandulosis tectus saepius glaber. LACINIAE calycinae integerrimae apice dilatatae, corollam superantes, intus et margine pilosae, extus glanduloso-hispidae. PETALA 5. cordato-emarginata, aenae purpurea, basi flavescentia. STAMINA numerosissima. STYGMA rubra, in capitulum sessile.

Proxima R. Alpinae, sed diversa 1° foliis simpliciter serratis: 2° petiolis plerumque aculeatis: 3° stipulis non dilatatis, sed conduplicatis: 4° floribus Corymbosis. R. Carolina discrepat à Rosa Hudsoniana aculeis stipularibus; Rosa autem Blanda differt caulibus primi anni aculeis rectis subreflexis tenuibus armatis, floribusque albis.